

Cumul des températures au 26 février 2023 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)

Plaine (300 à 500 m)	163 °	Demi-montagne (500 à 850 m)	136 °	Plateaux d'altitude (850 à 1100m)	89 °	Montagne (> 1100 m)	74 °
Rappel 2022 : 179 °		Rappel 2022 : 136 °		Rappel 2022 : 81 °		Rappel 2022 : 56 °	
CLERMONT 330 m	174 °	SAYAT 550 m	154 °	CHALMAZEL (42) 990 m	87 °	ANZAT LUGUET 1270 m	77 °
ISSOIRE 372 m	148 °	AMBERT 555 m	125 °	VERNINES 1045 m	100 °	MONT DORE 1220 m	71 °
COURPIERE 455 m	169 °	ST GERVAIS 705 m	132 °	ST GERMAIN L'H. 1070 m	88 °		
MOISSAT 340 m	169 °	ST SULPICE 851 m	122 °	MARCENAT (15) 1075 m	81 °		
Gain depuis 19 fév : + 43°		Gain depuis 19 fév : + 36°		Gain depuis 19 fév : + 26°		Gain depuis 19 fév : + 18°	

Sommes de température

Les sommes de température, cumulées à partir du 1^{er} février, correspondent à un stade de la prairie et aident à prévoir des dates d'intervention :

Apport d'azote avant 200 °

Exploitations suivies en 2023

Lezoux (400 m – VL bio)	52 VL, herbe + céréales. Fromages, crème ...
Ambert (550 m - VL)	80 VL, herbe + maïs + céréales
Augerolles (550 m - VA)	90 VA Charolaises, brouards, herbe+ céréales
St Maurice près Pionsat (600 m - VA)	60 VA Charolaises, brouards, herbe + céréales
Condat en Combrailles (700 m - VA)	110 VA Charolaises, brouards, herbe + céréales
Ceyssat (800 m- OL+VA)	50 Brebis Lacaunes, 23 VA Salers, 100% herbe, Transformation du lait de brebis
Laqueuille (1100 m - VA bio)	34 VA Salers, JB 15 mois finis herbe, Salers x Angus, 100% herbe
Picherande (1130 m - VL)	50 VL, 100% herbe St Nectaire fermier

Conseils de la semaine : dès le retour de la pluie, apports d'azote en plaine et demi-montagne, épandages organiques sur les plateaux d'altitude et en montagne

En plaine et demi-montagne, les 200°, repère de fin des apports d'azote sur fauches précoces sera atteint mi-mars. Actuellement les sols sont très secs, il est donc conseillé d'attendre les prochaines pluies pour faire ces apports. Les hersages destinés à répartir les bouses, et visualiser les foyers de taupes et campagnols doivent être réalisés avant le démarrage de la végétation (verdissement des prairies). **Attention à ne pas herser en période de gelées**, ce qui serait néfaste pour la prairie.

Sur les plateaux d'altitude et en montagne, profiter du fait que les sols sont portants pour réaliser les apports organiques. Les apports de fumier sont encore possibles cette semaine pour les récoltes de fin mai/début juin. Il ne reste que 15 jours pour les apports de lisier pour des récoltes prévues mi mai.

A toutes les altitudes, dernière ligne droite pour organiser son pâturage (cf bulletin N°1).

Notre campagne **d'analyses d'effluents** se finira le 30 mars, il est encore possible de faire passer vos échantillons via vos conseillers Chambres d'Agriculture ou EDE.