

Cumul des températures au 12 mars 2023 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)

Plaine (300 à 500 m)	240 °	Demi-montagne (500 à 850 m)	193 °	Plateaux d'altitude (850 à 1100m)	123 °	Montagne (> 1100 m)	101 °
Rappel 2022 : 273 °		Rappel 2022 : 214 °		Rappel 2022 : 129 °		Rappel 2022 : 98 °	
CLERMONT 330 m	256 °	SAYAT 550 m	222 °	CHALMAZEL (42) 990 m	122 °	ANZAT LUGUET 1270 m	104 °
MOISSAT 340 m (*)	246 °	AMBERT 555 m	183 °	VERNINES 1045 m	136 °	MONT DORE 1220 m	99 °
ISSOIRE 372 m	227 °	ST GERVAIS 705 m	185 °	ST GERMAIN L'H. 1070 m	118 °		
COURPIERE 455 m	237 °	ST SULPICE 851 m	171 °	MARCENAT (15) 1075 m	115 °	(*) source technicien	
Gain depuis 5 mars : +57 °		Gain depuis 5 mars : + 46 °		Gain depuis 5 mars : + 31 °		Gain depuis 5 mars : + 24 °	

Sommes de température

200 °C = apport d'azote sur fauches précoces les 15 jours précédant.

Entre 250 et 300°C = début des mises à l'herbe précoces

300-350 = semis et sursemis de prairies

Exploitations suivies en 2023

Lezoux (400 m – VL bio)	Mise à l'herbe les après midis depuis le 9 mars
Ambert (550 m - VL)	80 VL, herbe + maïs + céréales
Augerolles (550 m - VA)	Fin des apports d'azote sur parcelles d'ensilage
St Maurice près P. (600 m - VA)	Apport d'azote prévu d'ici 15 jours
Condat en Comb. (700 m - VA)	Derniers hersages. Apport azote sur fauches précoces dans les 10 jours
Ceyssat (800 m- OL+VA)	Mise à l'herbe des allaitantes vers 25/03. Début agnelages fin mars
Laqueuille (1100 m - VA bio)	34 VA Salers, JB 15 mois finis herbe, Salers x Angus, 100% herbe
Picherande (1130 m - VL)	50 VL, 100% herbe St Nectaire fermier

Conseils de la semaine : mises à l'herbe en plaine, préparation des mises à l'herbe en demi-montagne, apports d'éléments fertilisants sous condition sur fauche précoce en altitude.

Enfin la pluie est arrivée mais de manière très hétérogène. Accompagnée de chaleur en début de semaine, on peut s'attendre à une situation favorable pour la pousse de l'herbe. Les mesures de pousse ont démarré et vont nous permettre de suivre la croissance de l'herbe.

En plaine, les 1^{ères} mises à l'herbe peuvent débuter avec du fourrage complémentaire. C'est l'occasion de faire un tour rapide sur les pâtures ou sur le déprimé. En retirant l'herbe gelée ou sénescence, on active la pousse. Pour les petits ruminants, attendre des hauteurs d'herbe plus hautes pour limiter le risque parasitaire.

En demi-montagne, le repère des 250° sera atteint dans la semaine vers 500 m d'altitude et d'ici 10 jours environ à 700 m : clôtures et abreuvoirs doivent donc être opérationnels. Si besoin d'écartier les taupiers ou soulever de la mousse, le hersage est encore possible cette semaine mais pas au-delà, sous peine d'abimer la végétation et freiner son démarrage.

Sur les plateaux d'altitude et en montagne, la portance va être limitante en début de semaine pour faire des apports de fertilisants. Sur les sols non travaillés, le passage avec du matériel lourd type épandeur, tonne à lisier... ne sera pas rattrapable et contribue au tassement et à l'asphyxie des sols. Privilégiez les apports sur les parcelles qui se ressuint vite. Les 200° devraient être atteints avant la fin du mois.