

Cumul des températures au 2 avril 2023 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)

Plaine (300 à 500 m)	477 °	Demi-montagne (500 à 850 m)	386 °	Plateaux d'altitude (850 à 1100m)	266 °	Montagne (> 1100 m)	217 °
Rappel 2022 : 468 °		Rappel 2022 : 381 °		Rappel 2022 : 253 °		Rappel 2022 : 204 °	
CLERMONT 330 m	501 °	SAYAT 550 m	434 °	CHALMAZEL (42) 990 m	273 °	ANZAT LUGUET 1270 m	220 °
MOISSAT 340 m (*)	483 °	AMBERT 555 m	377 °	VERNINES 1045 m	285 °	MONT DORE 1220 m	214 °
ISSOIRE 372 m	462 °	ST GERVAIS 705 m	370 °	ST GERMAIN L'H. 1070 m	255 °		
COURPIERE 455 m	467 °	ST SULPICE 851 m	335 °	MARCENAT (15) 1075 m	251 °	(*) source technicien	
Gain depuis 26 mars : +76°		Gain depuis 26 mars : +61°		Gain depuis 26 mars : +43°		Gain depuis 26 mars : +33°	

Sommes de température

Entre 250 et 300°C : début des mises à l'herbe précoces

300°C : apport d'azote sur fauche tardive

300-350°C : semis et sursemis de prairies

500 °C : arrêt du déprimage

Exploitations suivies en 2023

Lezoux (400 m – VL bio)	Fin du 2 ^{ème} passage avec affouragement.
Ambert (550 m - VL)	1 ^{er} passage. Pâturage de jour.
Augerolles (550 m - VA)	Mise à l'herbe prévue cette semaine
St Maurice près P. (600 m - VA)	Mise à l'herbe dès que possible.
Condat en Comb. (700 m - VA)	Mise à l'herbe des génisses dès que possible.
Ceyssat (800 m- OL+VA)	Hersage fini. Apport de lisier sur fauches précoces.
Laqueuille (1100 m - VA bio)	34 VA Salers, JB 15 mois finis herbe, Salers x Angus, 100% herbe
Picherande (1130 m - VL)	Reprise du hersage dès que possible

Conseils de la semaine : arrêt du déprimage en plaine, pâturage en demi-montagne, début du pâturage sur les plateaux (selon météo), fin des apports d'azote sur fauche précoce en montagne.

En plaine, la croissance s'accélère. Le déprimage doit s'arrêter afin de ménager le rendement des futures fauches. Les parcelles de pâtures doivent toutes avoir eu un passage d'animaux pour éviter de se faire dépasser dans les prochains jours.

En demi-montagne bien exposée, tous les troupeaux devraient pâturer quitte à compléter en fourrages. La pousse a bien accéléré aussi.

En demi-montagne, sur parcelles plus froides, les hauteurs restent modestes, mais sont très variables selon la fertilité et l'hydromorphie. La pousse s'active. Faire le tour des parcelles pour choisir leur ordre de passage.

Sur les plateaux d'altitude, malgré les conditions froides, l'herbe change : elle reverdit et devient plus dense. Si les conditions météo le permettent, le pâturage peut commencer avec des fourrages complémentaires pour ménager la transition alimentaire.

En montagne, les apports d'azote sur fauche précoce se termineront dès que les conditions le permettront. Attention aux hersages par temps froid, qui peuvent pénaliser la croissance de l'herbe.