


1^{er} Bilan de la Pousse de l'herbe dans les pâtures au PRINTEMPS 2023

Après un mois de février sec, et de fréquentes gelées jusqu'au 10 mars, les mises à l'herbe ont souvent été retardées. Ensuite, avec un mois de mars généralement bien arrosé et de la douceur, la pousse de l'herbe est devenue très active avec un pic de pousse du 20 avril au 10 mai. Des pluies régulières et la hausse des températures ont été favorables à la reprise de la pousse à partir de mi-juin. Pour autant la fin du printemps n'aura pas suffi à rattraper le manque d'herbe, se traduisant au 30 juin, par un déficit cumulé de - 5 à - 13 % selon les secteurs.

En plaine (< 500 m) :

La mise à l'herbe a pu démarrer dès le 15-20 mars dans de bonnes conditions. Puis, le sec et le gel ont impacté le pic de pousse de l'herbe, obligeant les éleveurs à prolonger la complémentation des troupeaux. La reprise a été rapide. Ainsi, la pousse de l'herbe dans les pâtures est proche de la moyenne avec un léger déficit de -5%.





En montagne (> 850 m) :

La mise à l'herbe a débuté avec 10 jours de retard en raison des gelées et de problèmes d'engorgement. La pousse s'est ensuite accélérée pour fléchir à nouveau en raison de faibles températures. Depuis, la croissance est très forte. Le déficit cumulé fin juin est proche de 15%.

En demi-montagne (500 à 850 m) :

La mise à l'herbe a été retardée de 7 jours par les gelées et le manque d'eau. La pousse de l'herbe accuse un léger retard (5 jours) par rapport à la moyenne. Le fort pic de pousse a permis de rattraper le retard, obligeant souvent à débrayer des pâtures. Le déficit reste ainsi modéré par rapport la moyenne (-6%).



Ce bulletin clôt le début de la saison fourragère 2023.

Rendez-vous au mois d'août pour les bulletins Info-Maïs et les bulletins Info-Prairie sur la pousse d'automne.