



Repères

650 – 700 °C = stade début épiaison => début des fauches précoces (ensilage, foin ventilé...)

900 °C = stade début floraison => récolte des 1ers foins

1100° C = stade floraison => récolte des foins au sol

Exploitations suivies en 2024

Lezoux (320 m-VL bio)	Pâturage de jour Récoltes suspendues
Manglieu (460 m – bio)	Début 4 ^{ème} tour Broyage des refus dès que possible
Ambert (560 m – VA)	Réorganisation des lots. Débrayage de pâtures pour fauche
St Maurice près Pionsat (600 m -VA)	2 ^{ème} tour Fauche dès que possible
Tours sur Meymont (620 m – VL+VA bio)	5 ^{ème} tour de pâturage
Biollet (700 m -VA)	2 ^{ème} tour Ensilage terminé
Ceyssat (800 m– OL + VA)	2 ^{ème} tour Enrubannages en cours
St Genès la Tourette (830 m – VL bio)	Fin 3 ^{ème} tour Ensilage terminé
Egliseneuve d'Ent. (1050 m -VL)	Début du 3 ^{ème} tour Débrayage 1 parcelle

CUMUL DES TEMPÉRATURES AU 2 juin 2024 (cumul à partir du 1^{er} février, base 0 – 18°, source Météo-France)

Plaine (300 à 500 m)	1356 °	Demi-montagne (500 à 850 m)	1140 °	Plateaux d'altitude (850 à 1100 m)	853 °	Montagne (> 1100 m)	731 °
Rappel 2023 : 1287 °		Rappel 2023 : 1095 °		Rappel 2023 : 828 °		Rappel 2023 : 729 °	
CLERMONT 330 m	1392 °	SAYAT 550 m	1251 °	CHALMAZEL (42) 990 m	888 °	ANZAT LUGUET 1270 m	715 °
ISSOIRE 372 m	1373 °	AMBERT 555 m	1173 °	VERNINES 1045 m	884 °	MONT-DORE 1220 m	747 °
COURPIERE 455 m	1304 °	ST-GERVAIS 705 m	1094 °	ST-GERMAIN L'H. 1070 m	829 °		
(MOISSAT)* 340 m	NC	ST-SULPICE 851 m	991 °	MARCENAT (15) 1075 m	813 °	<i>*source technicien</i>	
Gain de la semaine : 103 °		Gain de la semaine : 87 °		Gain de la semaine : 70 °		Gain de la semaine : 63 °	

Conseils de la semaine : des conditions de récolte et de pâturage toujours très compliquées.

La météo continue d'être incertaine, et laisse peu d'espoir de fenêtres suffisantes pour récolter dans des conditions correctes. A toutes les altitudes, il y a des récoltes en attente, que ce soient des ensilages, des foins ou des regains. La pousse reste soutenue sur tous les secteurs.

En ce qui concerne les fauches, opter pour des hauteurs de coupe plus élevées que les recommandations habituelles : viser au moins 8 cm. Le rendement ne sera pas affecté, et les repousses seront plus rapides.

Si le fourrage est versé, les adaptations seront bien sûr différentes. Si la portance le permet, faucher « à revers » et dans un seul sens. L'utilisation de conservateur permet d'acidifier rapidement les silos. Les stades ayant fortement avancé, la proportion de tiges est plus importante, faire attention plus que jamais au tassage.

Pour les pâtures : l'objectif est de limiter le matraquage des parcelles. Lorsque cela est possible, limiter le temps d'accès au pâturage des animaux. Et bien sûr, pour ceux qui ont pu faucher, agrandir le tour de pâturage. Les conseils de notre bulletin n°12 du 29 avril restent valables, et consultables en ligne.

L'herbe gorgée d'eau favorise un transit rapide. Une complémentation en fourrage sec permet de limiter le phénomène. Privilégier du foin de 1^{ère} coupe, plus fibreux, que du regain.

Parasitisme et petits ruminants : c'est le moment de réaliser des coproscopies pour faire un état des lieux après deux mois de pâturage !