



Au sommaire

N°13 - 10 mai 2019

Météo	2
Colza	2
Potential très moyen.	2
Céréales	2
La rouille jaune est signalée sur variétés sensibles.	2
Très faible risque vis à vis de la septoriose.	3
Retrait de l'époxiconazole à la fin de la campagne 2019	3
Le vulpin montre son nez.	3
Betterave	3
Les pucerons s'installent.	3
Maïs	4
Quelques parcelles ont gelé.	4

Météo

De nouvelles pluies faibles sur la plaine, 10-15 mm, cela permet aux cultures de se maintenir ; les températures restent basses pour la saison, ce qui limite les besoins des céréales ; les cultures de printemps sont à la traîne.

Colza

Potentiel très moyen.

La plupart des parcelles sont aux stades siliques 4 à 6 cm, voire siliques bosselées, le potentiel apparaît très moyen, le taux d'avortement des siliques est dans certains cas très important. Signe que les colzas souffrent du sec, la floraison n'en finit pas (voir photo ci-contre).



Céréales

La rouille jaune est signalée sur variétés sensibles.

Plusieurs parcelles de Limagne (Nord et Sud) présentent des foyers de rouille jaune ; ils sont situés uniquement sur des variétés sensibles : Togano, Uli 12, Némo sont les 3 variétés concernées, mais Oregrain, Segor sont également à surveiller.

Il est impératif d'intervenir dès apparition de la maladie, car son expansion peut être très rapide. Les conditions de la semaine à venir seront toujours favorables, avec des températures fraîches pour la saison.

Intervenir avec une association triazole + strobilurine :

Exemples :

- Balmora 0.7 l/ha + Zoxis 0.7 l/ha
- Metcostar 90 0.7 l/ha + Zoxis 0.7 l/ha
- Zakeo Xtra 0.75 l/ha



Produit commercial	Matières actives	Dose homologuée	ZNT-DVP	Mention danger
BALMORA	Tébuconazole 250 g/l	1 l/ha	5m - 5m	H302 - H332 - H318 - H335 - H361d - H410
ZOXIS	Azoxistrobine 250 g/l	1 l/ha	5m - 0	H410
METCO STAR 90	Metconazole 90 g/l	1 l/ha	5m - 0	H319 - H361d - H373 - H411

ZAKEO XTRA	Cyproconazole 80 g/l + azoxistrobine 200g/l	1 l/ha	5m - 0	H302 - H332 - H360D - H410
------------	---	--------	--------	----------------------------

Très faible risque vis à vis de la septoriose.

A ce jour, aucune parcelle de notre réseau n'est au seuil d'intervention.

Voir la fiche Septoriose d'Arvalis institut du végétal en [cliquant ICI](#)



Retrait de l'époxiconazole à la fin de la campagne 2019.

C'est la dernière campagne pour utiliser les produits à base d'époxiconazole. A partir de la campagne prochaine, il sera interdit de les utiliser. Pensez donc à faire le point sur les stocks de fongicide dans vos armoires phytosanitaires et à utiliser en priorité les produits à base d'époxiconazole. Parmi les fongicides contenant de l'époxiconazole, nous pouvons citer ADEXAR, CERIX, VIVERDA, ABACUS SP, RUBRIC, OPUS, OPUS NEW, CEANDO, MAREDO, OPERA, OSIRIS WIN.

Cette liste est non exhaustive étant donnée la multitude de noms commerciaux qui peuvent exister pour un même produit. Lisez attentivement l'étiquette des produits et mettez de côté ceux contenant de l'époxiconazole.

Le vulpin montre son nez.

Les premiers épis de vulpin passent au-dessus du blé (photo ci-contre), constat des difficultés de plus en plus importantes à maîtriser les graminées dans les céréales, tous les leviers agronomiques doivent être actionnés dans les parcelles à problème.



Betterave

Les pucerons s'installent.

Sans traitement de semences avec néonicotinoïdes, les pucerons doivent être surveillés de près. Le puceron vert le plus à risque est *Myzus persicae*, il peut transférer efficacement les différentes jaunisses de la betterave. **Le seuil d'intervention est fixé à 10% de plantes porteuses de pucerons vert.** Voir BSV et note AGRO de Cristal Union.





Des pucerons noirs de la fève, *Aphis fabae*, sont observés sur plante, mais ces derniers ont un potentiel d'infection moins important, par contre ils se multiplient plus rapidement. A surveiller.

Pour améliorer la reconnaissance des pucerons voir l'encyclopédie de l'INRA en [cliquant ICI](#)

Maïs

Quelques parcelles ont gelé.

La levée des maïs s'éternise à la faveur de températures en dessous des normales de saison. Les premières levées ont subi un coup de gel fin de semaine dernière, rien d'alarmant, l'apex qui est encore en terre est protégé, les maïs vont repartir.

Par contre, il faut attendre avant de désherber que les parcelles aient retrouvé un bon état végétatif.



UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !
AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE
EN CHARGE DE
L'AGRICULTURE,
SOUS LE NUMÉRO
IF01762

Bulletin rédigé par Debrune O - Ginestière Y. – Lère F. – Moigny F.

Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme - Pôle productions

11 allée Pierre de Fermat - BP 70007 - 63171 Aubière

Tél. : 04 73 44 45 95 - Fax : 04 73 44 45 50


**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
PUY-DE-DÔME

**ENGAGEMENT
DE SERVICE**
SERVICES AUX AGRICULTEURS
ET ACTEURS DES TERRITOIRES
REF. 221
AFNOR CERTIFICATION
www.afnor.org
Conseil-Formation


Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION
avec la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
« Développement agricole et
rural »