



Au sommaire


N°20 - 25 juin 2020

Mais	1
Pyrale, intervention cette semaine	1
Lutte chimique	2
Lutte préventive	2
Blé	3
Confirmation du virus de la mosaïque des stries	3
Divers	3
Lutte contre l'ambroisie	3
Jachère	4
Règles d'entretien des jachères	4

Mais

Pyrale, intervention cette semaine

Le graphique des sommes de températures base 10, ci-contre montre que nous sommes dans la période de vol des pyrales, le pic de ponte est prévue à partir de cette fin de semaine (source BSV Auvergne de cette semaine).



Lutte chimique

Les dates d'interventions recommandées en conventionnelles sont en cours, intervenir sans tarder car le pic de ponte est à prévoir à partir de cette fin de semaine et semaine prochaine, selon les secteurs.

Secteurs	Date de traitement optimale (+- 3 jours)
Limagne centrale	20 juin
Limagne nord et sud (val d'allier)	25 juin
Limagne sud (côteaux)	29 juin


Le premier enjeu de la lutte contre la pyrale et la préservation du rendement, mais le second enjeu est tout aussi important, c'est la qualité sanitaire.

Il est indispensable de bien maîtriser la pyrale pour minimiser les portes d'entrée pour les fusariose, et ainsi préserver la qualité sanitaire du maïs en mycotoxines.

Lutte préventive

Il ne faut pas oublier la lutte préventive qui consiste au broyage fin des résidus au moment de la récolte, et/ou à l'enfouissement des résidus, pour minimiser la contamination de la culture suivante.

Les produits efficaces sont assez proche, avec un plus pour CORAGEN, comme le montre les essais Arvalis institut du végétal ci-dessous.



Produit	Matière active	Dose AMM	ZNT - DVP	Mention de danger
Coragen	Chlorantaniliprole	0,125 l/ha	5 m -	H410
Karate Zeon	Lambda-cyhalotrine	0,2 l/ha	50 m -	H302 - H332 - H317 - H410
Success 4 (AB)	Spinosad	0,2 l/ha	5 m-	H410

(AB) utilisable en agriculture biologique

En cas de traitement au stade limite passage tracteur, qui sera atteint dans les prochains jours, nous recommandons le CORAGEN, qui a une meilleure persistance d'action.

Blé

Confirmation du virus de la mosaïque des stries

Suite aux observations de blanchiment sur la dernière feuille du blé à la mi-mai. Les premiers résultats des tests ELISA réalisées par le laboratoire d'**Arvalis institut du végétal** sur les échantillons issus de parcelles de Limagne, **confirme la présence du virus de la mosaïque des stries (WSMV), photo ci-contre**. Ce virus est transmis par un acarien qui se serait développé à la faveur de la sécheresse de mars-avril.

[Voir article d'arvalis institut du végétal ICI](#)



Divers

Lutte contre l'ambrosie

La lutte contre l'ambrosie se déplace aux bordures de champ, l'année est très précoce, nous retrouvons donc des ambrosie qui ont déjà un fort développement (voir photo ci-contre) !

Il est donc important de les détruire mécaniquement ou chimiquement avant le début de la floraison.



Jachère

Règles d'entretien des jachères

Les dates d'interdiction de broyage des jachères commencent le **1 juin** et se terminent le **10 juillet** inclus.

Il n'est pas possible de récolter les jachères, par contre les bandes tampons et les bordures de champ n'ont pas de contrainte.

