

Conseils du mois : dès que les conditions de portance et de chaleur redeviennent favorables, apports d'azote en plaine pour les fauches précoces.

- **En plaine**, le mois de janvier a été très doux et certaines prairies ont reverdi. Les conditions froides de début février ont mis un coup de frein à ce démarrage précoce. Les apports d'azote minéral sur fauche précoce pourront être réalisés dès que les conditions de portance et de chaleur redeviendront favorables.
- **En demi-montagne** (dès 600m), au vu des sommes de températures rien ne presse pour apporter l'azote minéral. Les 1ers apports ne sont pas à envisager avant fin février. Nous vous préciserons les dates d'apport adaptées dans un prochain bulletin en fonction des conditions climatiques des 15 prochains jours.

• Quelle dose d'engrais minéral apporter?

Pour les prairies, les doses habituelles d'engrais de ferme couvrent la plupart des besoins en phosphore et potasse l'année de l'apport (voir bulletin n°1).

Les apports d'azote complémentaires sont à moduler en fonction de l'utilisation de la prairie. Pour calculer les doses, consultez notre *guide régional de fertilisation* sur notre site internet.

Par exemple pour une récolte précoce (type ensilage, enrubannage ou foin précoce) à rendement élevé (6 à 7 TMS/an) prévoir :

- 50 unités d'azote minéral / ha en complément d'un apport organique
- 80 unités d'azote minéral / ha s'il n'y a pas eu d'apport organique

Pour les prairies avec une forte proportion de légumineuses, on peut diminuer ces apports de moitié.

Privilégiez des engrais contenant de l'azote rapidement assimilable sous forme nitrique et ammoniacale.

Pour les prairies qui ne recevraient pas d'apports organiques (éloignement...), le **choix de l'engrais** à apporter sur les fauches doit respecter une formule dont l'équilibre est de type 1,5N/1P/2K (comme un 15/10/20 par exemple). Pour les pâtures, on privilégie une formule de type 3N/1P/2K comme un (par ex : 20/5/10).

• Pâturage hivernal

Pour respecter les 2 mois de repos hivernal, les parcelles pâturées aujourd'hui ne pourront être à nouveau pâturées avant mi-avril!

- **Préparer son pâturage dès l'hiver, c'est une mise à l'herbe précoce réussie !**

Formations

Renforcer l'autonomie fourragère de son exploitation pour en améliorer la rentabilité

les 6 mars et 27 avril 2018

à Olliegues

Contact : Territoire Dore Livradois Forez au 04 73 82 09 74

Exploitations suivies en 2018	
Courpière (400 m – VL bio)	80 VL Herbe et céréales Lait+transformation
Sugères (610 m- VA)	85 VA limousines 100% herbe Broutards
Mazayes (800 m – VL bio)	80 VL 100% herbe Lait
Pulvérières (860 m– VA)	50 VA charolaises Herbe et céréales Broutards
Egliseneuve d'Entraigue (1000 m – VL)	35 VL 100% herbe St Nectaire fermier
Laqueuille (1100 m – ovins bio)	164 brebis Limousines 100% herbe Agneaux finis à l'herbe