

Cumul des températures au 18 mars 2018 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)

Plaine (300 à 500 m)	230 °	Demi-montagne (500 à 850 m)	163 °	Plateaux d'altitude (850 à 1100m)	93 °	Montagne (> 1100 m)	63 °
Rappel 2017 : 386°		Rappel 2017 : 312°		Rappel 2017 : 217°		Rappel 2017 : 181°	
CLERMONT 330 m	243 °	SAYAT 550 m	189 °	CHALMAZEL (42) 990 m	102 °	LAQUEUILLE 1100 m (*)	93 °
MOISSAT 340 m (*)	244 °	AMBERT 555 m	173 °	VERNINES 1045 m	94 °	ANZAT LUGUET 1270 m	66 °
ISSOIRE 372 m	234 °	ST GERVAIS 705 m	147 °	ST GERMAIN L'H. 1070 m	91 °	MONT DORE 1220 m	60 °
COURPIERE 455 m	211 °	ST SULPICE 851 m	125 °	MARCENAT (15) 1075 m	87 °	(* source agriculteur, technicien)	
Gain depuis 11 mars : +60°		Gain depuis 11 mars : +43 °		Gain depuis 11 mars : +24 °		Gain depuis 11 mars : +16°	

Sommes de températures mode d'emploi

Les sommes de températures aident à prévoir les dates d'intervention

Apports d'azote minéral sur fauche précoce avant 200°

Mise à l'herbe entre 250 et 300°

Conseils de la semaine : début des mises à l'herbe en plaine, apports d'azote en demi-montagne et fin des apports organiques en montagne

En plaine, au vu des sommes de températures, les premiers troupeaux pourraient sortir en fin de semaine (repère des 250 °). Aujourd'hui la portance et la pousse de l'herbe sont limitantes sur de nombreuses parcelles. Sur les prairies portantes, on peut commencer à sortir les troupeaux quelques heures par jour ou toute la journée avec du fourrage en complément. Sortir tôt permet aux animaux d'avoir une transition alimentaire suffisamment longue (au moins 3 semaines) et d'être en capacité de pâturer pleinement avant l'explosion de l'herbe (500-600°). C'est un gage de réussite pour une herbe de qualité tout au long du printemps.

En demi-montagne, sur les altitudes les plus basses les prairies verdissent. Les premières mises à l'herbe (250° environ) s'envisagent alors sur les derniers jours de mars. Les apports d'azote minéral sur fauche précoce sont à faire cette semaine si les sols sont suffisamment portants.

Sur les plateaux et en montagne, terminer les apports organiques. Les apports d'azote sur fauche précoce sont à envisager d'ici 2 à 3 semaines (estimation des 200 °). Des hersages ciblés peuvent être réalisés pour répartir les bouses, niveler le terrain et écarter les taupiers.

Lutte contre les taupes et campagnols : réaliser un hersage permet de repérer les indices frais de nuisibles en vue d'une lutte raisonnée et ciblée. Il est préconisé de passer la herse avant le démarrage en végétation, sur sols portants et non gelés, en réalisant un travail superficiel pour éviter de dégrader la prairie en place.

Exploitations suivies en 2018

Courpière (400 m – VL bio)	Mise à l'herbe prévue dès que sols portants Entretien des clôtures
Sugères (610 m- VA)	Mise à l'herbe prévue début avril
Mazayes (800 m – VL bio)	Passage de herse prévu dès que les sols se ressuient
Pulvérières (860 m – VA)	50 VA charolaises Herbe et céréales Broutards
Egliseneuve d'Entraigue (1000 m – VL)	35 VL 100% herbe St Nectaire fermier
Laqueuille (1100 m – ovins bio)	164 brebis Limousines 100% herbe Agneaux finis à l'herbe