

Cumul des températures au 25 mars 2018 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)

Plaine (300 à 500 m)	264 °	Demi-montagne (500 à 850 m)	184 °	Plateaux d'altitude (850 à 1100m)	103 °	Montagne (> 1100 m)	71 °
Rappel 2017 : 449°		Rappel 2017 : 362°		Rappel 2017 : 255°		Rappel 2017 : 214°	
CLERMONT 330 m	281 °	SAYAT 550 m	217 °	CHALMAZEL (42) 990 m	113 °	LAQUEUILLE 1100 m (*)	106 °
MOISSAT 340 m (*)	281 °	AMBERT 555 m	196 °	VERNINES 1045 m	104 °	ANZAT LUGUET 1270 m	74 °
ISSOIRE 372 m	270 °	ST GERVAIS 705 m	166 °	ST GERMAIN L'H. 1070 m	100 °	MONT DORE 1220 m	66 °
COURPIERE 455 m	242 °	ST SULPICE 851 m	138 °	MARCNAT (15) 1075 m	95 °	(* source agriculteur, technicien)	
Gain depuis 18 mars : +34°		Gain depuis 18 mars : +21 °		Gain depuis 18 mars : +10 °		Gain depuis 18 mars : +8°	

Sommes de températures mode d'emploi

Les sommes de températures aident à prévoir les dates d'intervention

Apports d'azote minéral sur fauche précoce avant 200°

Mise à l'herbe entre 250 et 300°

Conseils de la semaine : mises à l'herbe en plaine, fin des apports d'azote en demi-montagne, arrêt des fumures organiques en montagne.

La semaine écoulée a été froide, et les cumuls s'en ressentent. Nous avons toujours 3 semaines à un mois de retard par rapport à l'année passée. La semaine à venir devrait être plus douce, sans excès.

En plaine, La pousse est encore très lente (de l'ordre de 15 kg MS/ha/j) sur les pâtures. Il faut donc faire soit du pâturage de jour, soit compléter pour nourrir les animaux. Les premières mises à l'herbe commencent sur des parcelles portantes, à déprimer ou à ressemer (repousses de céréales par exemple). Les 300° devraient être atteints en fin de semaine.

En demi-montagne, les parcelles exposées aux vents n'ont pas évolué cette semaine. Par contre, les prairies fertiles abritées commencent à montrer des hauteurs non négligeables (6-7 cm). Il ne faut plus faire de hersage sur ce type de parcelle, sous peine de pénaliser fortement la pousse. Les apports d'azote sur fauche précoces sont à terminer impérativement cette semaine. Dès la semaine prochaine, sur les zones les moins froides, on devrait pouvoir commencer de sortir des animaux sur des parcelles de déprimage.

Sur les plateaux et en montagne, ayez à l'esprit que les parcelles qui reçoivent des apports organiques en ce moment ne pourront pas être récoltées avant début juin, si l'on veut respecter 2 mois entre l'apport d'effluent et la récolte. Les apports d'azote pour les fauches précoces pourront commencer dès que les sols seront portants sur les plateaux, en montagne rien ne presse.

Exploitations suivies en 2018

Courpière (400 m – VL bio)	Sortie des VL les après midis depuis le 22 mars.
Sugères (610 m- VA)	Clôtures mobiles installées, échographies faites.
Mazayes (800 m – VL bio)	Passage de herse Epanchage de lisier
Pulvrières (860 m – VA)	50 VA charolaises Herbe et céréales Broutards
Egliseneuve d'Entraigue (1000 m – VL)	35 VL 100% herbe St Nectaire fermier
Laqueuille (1100 m – ovins bio)	164 brebis Limousines 100% herbe Agneaux finis à l'herbe