

### Cumul des températures au 15 avril 2018 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)

Plaine (300 à 500 m)	488 °	Demi-montagne (500 à 850 m)	370 °	Plateaux d'altitude (850 à 1100m)	234 °	Montagne (> 1100 m)	175 °
<b>Rappel 2017 : 699°</b>		<b>Rappel 2017 : 584°</b>		<b>Rappel 2017 : 431°</b>		<b>Rappel 2017 : 385°</b>	
CLERMONT 330 m	514 °	SAYAT 550 m	422 °	CHALMAZEL (42) 990 m	253 °	LAQUEUILLE 1100 m (*)	232 °
MOISSAT 340 m (*)	514 °	AMBERT 555 m	381 °	VERNINES 1045 m	238 °	ANZAT LUGUET 1270 m	179 °
ISSOIRE 372 m	489 °	ST GERVAIS 705 m	345 °	ST GERMAIN L'H. 1070 m	227 °	MONT DORE 1220 m	170 °
COURPIERE 455 m	461 °	ST SULPICE 851 m	297 °	MARCNAT (15) 1075 m	217 °	(* source agriculteur, technicien)	
<b>Gain depuis 8 avril : + 78°</b>		<b>Gain depuis 8 avril : + 67°</b>		<b>Gain depuis 8 avril : + 47°</b>		<b>Gain depuis 8 avril : + 37°</b>	

### Sommes de température mode d'emploi

Les sommes de température aident à prévoir des dates d'intervention :

- 250 à 300° : Début mise à l'herbe**
- 350° : Azote sur fauche tardive**
- 500° : Fin déprimage/fin 1er tour**
- 650-700° : Début des ensilages**

## Conseils de la semaine : fin du 1<sup>er</sup> tour en plaine, fin des apports d'azote sur fauche tardive en demi-montagne, mise à l'herbe sur les plateaux et fin des apports d'azote sur fauche précoce en montagne

**En plaine**, la croissance d'herbe est forte (70 kg MS/ha/jour). Pour bien gérer une telle pousse, les chargements de moins de 30 ares/UGB sont adaptés. L'herbe feuillue est d'excellente qualité, les animaux ont tout intérêt à pâturer jour et nuit dès maintenant. Il est temps de fermer les silos et de diminuer les quantités de concentrés distribuées (-1 kg/UGB sur 3 jours). Sortir les animaux des parcelles destinées à la fauche pour ne pas pénaliser les rendements et terminer le premier passage de pâturage.

**En demi-montagne**, la pousse reste active (30 à 40 kg MS/ha/jour). Il est important de faire le tour de vos parcelles et de limiter les surfaces de déprimage si la pousse est importante. Tous les troupeaux doivent être sortis. Les apports d'azote sur fauches tardives non déprimées doivent se terminer. Pour les parcelles déprimées, l'apport se fera après le passage des animaux.

**Sur les plateaux**, la pousse est encore limitée (15 kg MS/ha/jour) mais les parcelles changent à vue d'œil. Pour permettre une transition alimentaire suffisamment longue (3 semaines), les animaux peuvent commencer à sortir sur des grandes surfaces avec du fourrage en complément. Les parcelles de fauche peuvent être déprimées.

**En montagne**, les mises à l'herbe précoces pourront commencer en fin de semaine. Privilégier alors les parcelles portantes et faire pâturer de grandes surfaces. Les apports d'azote sur fauches précoces doivent se terminer.

### Exploitations agricoles suivies en 2018

Courpière (400 m – VL bio)	Début du 2 <sup>ème</sup> tour de pâturage
Sugères (610 m- VA)	1 <sup>er</sup> tour de pâturage pour tous les lots
Mazayes (800 m – VL bio)	Pâturage des VL 8h00/jour Sortie des génisses
Pulvérières (860 m– VA)	Sortie des vaches prévue cette semaine
Egliseneuve d'Entraigue (1000 m – VL)	Sortie des VL quelques heures/jour
Laqueuille (1100 m- ovins bio)	164 brebis Limousines 100% herbe