

Cumul des températures au 13 mai 2018 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)

Plaine (300 à 500 m)	888 °	Demi-montagne (500 à 850 m)	722 °	Plateaux d'altitude (850 à 1100m)	526 °	Montagne (> 1100 m)	454 °
Rappel 2017 : 977°		Rappel 2017 : 816°		Rappel 2017 : 597°		Rappel 2017 : 538°	
CLERMONT 330 m	923 °	SAYAT 550 m	808 °	CHALMAZEL (42) 990 m	550 °	LAQUEUILLE 1100 m (*)	519 °
MOISSAT 340 m (*)	915 °	AMBERT 555 m	738 °	VERNINES 1045 m	534 °	ANZAT LUGUET 1270 m	467 °
ISSOIRE 372 m	888 °	ST GERVAIS 705 m	680 °	ST GERMAIN L'H. 1070 m	521 °	MONT DORE 1220 m	440 °
COURPIERE 455 m	853 °	ST SULPICE 851 m	619 °	MARCNAT (15) 1075 m	499 °	(* source agriculteur, technicien)	
Gain depuis 6 mai : + 101 °		Gain depuis 6 mai : + 87 °		Gain depuis 6 mai : + 70 °		Gain depuis 6 mai : + 69 °	

Repères à connaître

500° : Fin déprimage /fin 1er tour

650-700° : Ensilage, enrubannage et foin ventilé

Repères pâturage

Hauteur d'entrée (plein pâturage) : 10-12 cm = herbe à la cheville

Hauteur de sortie : 5 cm = herbe au talon de la botte

Conseils de la semaine : fauche dès que possible en demi-montagne, préparation des fauches sur les plateaux, et fin du 1er tour en montagne

En plaine, la pousse de l'herbe est toujours conséquente (75 Kg MS/ha/j). Cette croissance permet de rester sur des surfaces de pâture assez restreintes (30 ares/UGB sur des parcelles fertiles). Le stade des foins précoces (début floraison) sera atteint dans la semaine mais les récoltes devront attendre le ressuyage et la chaleur.

En demi-montagne, les croissances d'herbe sur les pâtures sont conformes à la moyenne pour la saison (50 Kg MS/ha/j). Les parcelles non récoltées sont à pleine épiaison sur les zones basses. A partir de ce stade, leur qualité se déprécie de jour en jour. Au minimum, un créneau de 3 jours de beau temps sera nécessaire pour réaliser de l'ensilage et 4 j pour de l'enrubannage. Des hauteurs de coupe suffisantes (> 7 cm) favoriseront le ressuyage.

Sur les plateaux d'altitude, la pousse de l'herbe reste modeste (30 à 40 Kg MS/ha/j) en raison des conditions hivernales. Continuer de faire tourner sur les pâtures pour profiter de la bonne qualité de l'herbe avant que l'explosion de la pousse arrive (entre 500 et 600°). La complémentation en fourrage doit être limitée et l'apport de concentrés se réduire progressivement. Le déprimage est encore possible cette semaine sur les végétations tardives. Les fauches précoces à 650° s'envisagent d'ici 10-12 jours.

En montagne, pour pallier une pousse encore timide, profiter de la semaine pour faire du déprimage sur les parcelles de fauche. Toutefois, le 1er tour de pâture devrait se terminer d'ici 8 à 10 jours afin de conserver une herbe de qualité, feuillue et sans épis. En attendant qu'un ressuyage s'opère, privilégier les parcelles portantes.

Exploitations suivies en 2018

Courpière (400 m – VL bio)	Ensilage réalisé le 7 mai. Milieu du 3ème tour
Sugères (610 m- VA)	2nd tour de pâture. Enrubannage dès que possible.
Mazayes (800 m – VL bio)	Fauche d'une pâture en enrubannage le 11 mai. Ensilage dès que possible.
Pulvérières (860 m – VA)	Fin du 1er tour de pâture
Egliseneuve d'Entraigue (1000 m – VL)	Milieu du 2nd tour de pâture
Laqueuille (1100 m- ovins bio)	Fin du 1er tour de pâture