

Premier Bilan de la Pousse de l'herbe dans les pâtures au PRINTEMPS 2018



Après une première moitié d'année 2018 qui aura vu se succéder des périodes froides, sèches et pluvieuses, le bilan de la pousse de l'herbe mesuré dans les 6 exploitations suivies sur le département montre des situations très contrastées selon l'altitude.

En plaine (< 500 m) et demi-montagne (500 à 850 m) :

Les mises à l'herbe se sont plutôt bien déroulées avec un démarrage proche de la moyenne observée sur 10 ans et une augmentation rapide de la pousse en avril.


Puis, les fortes pluies de fin mai et début juin ont fortement gêné le pâturage. Ainsi, même si la pousse de ce printemps est supérieure à la moyenne, elle n'a pas toujours pu être valorisée à son maximum.

Fin juin, le niveau de réserve en eau des sols se situe entre 45 % en plaine et 75 % en demi-montagne ce qui laisse augurer d'une pousse correcte en début d'été.



En montagne (> 850 m) :

Contrairement au reste du département, les mises à l'herbe ont été retardées d'au moins 15 jours par le froid et les chutes de neige tardives. Ce retard s'est prolongé tout au long du printemps et il aura fallu attendre fin mai pour atteindre des niveaux de croissance supérieurs à la moyenne. Fin juin, le cumul de pousse de ce printemps est déficitaire. Pour autant, les réserves en eau élevées (>80%) et le retour de la chaleur permettent d'envisager de bonnes conditions de pâture pour le début de l'été.



Ce bulletin clôt le début de la saison fourragère. Nous poursuivons nos mesures que vous trouverez sur les courbes de croissance (voir encadré). Rendez-vous au mois d'août pour les bulletins Info-Maïs et les bulletins Info-Prarie sur la pousse d'automne.

Retrouvez les courbes de croissance, secteur par secteur, sur le site de la Chambre d'Agriculture («<http://puydedome.chambre-agriculture.fr>») à la rubrique Elevage / Fourrages / Pousse de l'herbe