

Cumul des températures au 24 février 2019 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)

Plaine (300 à 500 m)	163 °	Demi-montagne (500 à 850 m)	141 °	Plateaux d'altitude (850 à 1100m)	99 °	Montagne (> 1100 m)	85 °
Rappel 2018 : 63 °		Rappel 2018 : 38 °		Rappel 2018 : 17 °		Rappel 2018 : 12 °	
CLERMONT 330 m	173 °	SAYAT 550 m	154 °	CHALMAZEL (42) 990 m	89 °	LAQUEUILLE 1100 m (*)	NC
ISSOIRE 372 m	148 °	AMBERT 555 m	110 °	VERNINES 1045 m	125 °	ANZAT LUGUET 1270 m	82 °
COURPIERE 455 m	168 °	ST GERVAIS 705 m	137 °	ST GERMAIN L'H. 1070 m	91 °	MONT DORE 1220 m	88 °
		ST SULPICE 851 m	136 °	MARCENAT (15) 1075 m	91 °	(* source agriculteur)	
Gain depuis 17 fév : + 57°		Gain depuis 17 fév : + 55 °		Gain depuis 17 fév : + 43 °		Gain depuis 17 fév : + 40 °	

Pour **recevoir le bulletin info-prairie**, ainsi que des données complémentaires par mail **dès le mardi**, inscrivez vous à :
fourrages@puy-de-dome.chambagri.fr

J'anticipe

A St Sulpice, j'ai un cumul de 136°.
Pour terminer mes **apports d'azote** (avant 200°), il manque 64° (200 – 136). A raison de 55 degrés/semaine, cela représente 8-9 jours.

Formation

En système d'élevage, je produis plus de protéines pour être autonome

Formation adaptée aux élevages en agriculture biologique

les 11 mars et 11 avril 2019
à Aubière

Contact : Angélique Sérange
au 04 73 44 45 52

Conseils de la semaine : dès le retour de la pluie, apports d'azote en plaine et en demi montagne pour les fauches précoces

Ces dernières semaines, les cumuls de températures avancent de manière exceptionnelle. Par rapport à la moyenne, il y a au minimum 10 jours d'avance . En revanche, la durée du jour encore limitée et l'absence d'eau ne permet pas toujours le redémarrage des végétations.

En plaine et en demi montagne, il est conseillé d'attendre la pluie pour faire les 1^{ers} apports de fertilisation minérale. Si les précipitations se confirment, ces apports s'envisagent en fin de semaine et la semaine prochaine, soit 15 jours avant le démarrage de végétation (avant 200°) pour les fauches précoces (ensilage et enrubannage). Les hersages, destinés à répartir les bouses, la terre et visualiser les foyers de taupes et campagnols, sont réalisables, eux aussi, avant le démarrage de la végétation. Les apports pour les parcelles en foin au sol peuvent attendre 350°.

Sur les plateaux d'altitude et en montagne, les apports de fumier sont encore possibles cette semaine pour les récoltes de fin mai/début juin. Il reste environ 15 jours pour réaliser les apports de lisier pour les fauches prévues au plus tard, mi-mai. Si les cumuls de températures ne faiblissent pas, la fertilisation minérale est prévue d'ici 2 à 3 semaines.

Nos bulletins Info-prairie reprennent leur parution hebdomadaire.