

### Cumul des températures au 28 avril 2019 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)

Plaine (300 à 500 m)	775 °	Demi-montagne (500 à 850 m)	650 °	Plateaux d'altitude (850 à 1100m)	462 °	Montagne (> 1100 m)	392 °
<b>Rappel 2018 : 686 °</b>		<b>Rappel 2018 : 552 °</b>		<b>Rappel 2018 : 390 °</b>		<b>Rappel 2018 : 327 °</b>	
CLERMONT 330 m	819 °	SAYAT 550 m	732 °	CHALMAZEL (42) 990 m	491 °	ANZAT LUGUET 1270 m	394 °
ISSOIRE 372 m	738 °	AMBERT 555 m	592 °	VERNINES 1045 m	515 °	MONT DORE 1220 m	390 °
COURPIERE 455 m	768 °	ST GERVAIS 705 m	630 °	ST GERMAIN L'H. 1070 m	451 °		
MOISSAT 340 m	793 °	ST SULPICE 851 m	584 °	MARCENAT (15) 1075 m	433 °		
<b>Gain depuis 21 avril : 86 °</b>		<b>Gain depuis 21 avril : 70 °</b>		<b>Gain depuis 21 avril : 49 °</b>		<b>Gain depuis 21 avril : 40 °</b>	

**Je me repère**  
**350° : sursemis et apport d'azote sur fauche tardive**  
**500° : Fin du déprimage et fin du 1<sup>er</sup> tour de pâture**  
**650-700° : Début des ensilages, enrubannage et foin ventilé**

### Exploitations suivies en 2019

Bord l'étang (400 m-GN lait)	Plein pâturage des GN
Sugères (610 m- VA)	Début du 2 <sup>nd</sup> tour avec affouragement ou rajout d'une parcelle.
Neuf Eglise (610 m- VA)	1 <sup>er</sup> tour de pâture pour tous les lots.
Chaméane (800 m- VL bio)	Début 2 <sup>nd</sup> tour. Augmentation du temps de pâturage.
St-Genès-Ch <sup>elle</sup> (850 m-ovins bio)	Fin 1 <sup>er</sup> tour.
Pulvérières (860 m- VA)	1 <sup>er</sup> tour de pâture pour tous les lots.
Egliseneuve d'Ent. (1000 m – VL)	Un lot de GN sorti. Mise à l'herbe des VL ce jour.
Laqueuille (1100 m-ovins bio)	Mise à l'herbe des agnelles et des brebis suitées ce jour.

## Conseils de la semaine : début des ensilages en plaine, plein pâturage en demi-montagne, mises à l'herbe en altitude

**Après le retour des pluies, plus ou moins conséquentes, les conditions de pousse semblent plus favorables. Si les températures remontent, il faudra être réactif pour bien gérer l'herbe.**

**En plaine,** le stade des fauches précoces est atteint. Dès que trois jours de beau temps sont annoncés, il faudrait faucher malgré des quantités de fourrage parfois restreintes, au risque de perdre de la qualité assez rapidement. Sur les pâtures, la croissance devient plus conséquente et permet le plein pâturage.

**En demi-montagne,** les 1<sup>ères</sup> récoltes s'envisagent d'ici 10 à 15 jours. Sur les pâtures, la pousse s'accélère (45 à 65 Kg MS/ha/j). Si des fourrages sont distribués, les réduire, tout comme les concentrés, pour maximiser l'ingestion d'herbe de qualité. Pour ceux qui n'ont pas fini le 1<sup>er</sup> tour, se recentrer sur les surfaces de pâture.

**Sur les plateaux d'altitude,** tous les troupeaux doivent sortir. A moins de 900 m, la croissance s'active. Faire un 1<sup>er</sup> tour sur l'ensemble des pâtures assez rapidement. A plus de 1000 m, le déprimage est possible sur les 10-12 prochains jours en attendant des pousses plus conséquentes. Le peu de hauteur d'herbe ne doit pas inciter à pâturer ras. En dessous de 4 cm (semelle de la botte), la végétation mettra plus de 10 j à repartir.

**En montagne,** la mise à l'herbe peut débuter lorsque la complémentation en fourrages est possible pour pallier une croissance encore peu active ou sur de grandes surfaces. Ceci permet également de réaliser un changement de ration en douceur sur une période d'environ 3 semaines.