

### Cumul des températures au 26 mai 2019 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)

Plaine (300 à 500 m)	1112°	Demi-montagne (500 à 850 m)	933°	Plateaux d'altitude (850 à 1100m)	674°	Montagne (> 1100 m)	583°
<b>Rappel 2018 : 1085 °</b>		<b>Rappel 2018 : 902 °</b>		<b>Rappel 2018 : 676 °</b>		<b>Rappel 2018 : 599 °</b>	
CLERMONT 330 m	1167 °	SAYAT 550 m	1051 °	CHALMAZEL (42) 990 m	664 °	ANZAT LUGUET 1270 m	585 °
ISSOIRE 372 m	1086 °	AMBERT 555 m	888 °	VERNINES 1045 m	729 °	MONT DORE 1220 m	580 °
COURPIERE 455 m	1082 °	ST GERVAIS 705 m	893 °	ST GERMAIN L'H. 1070 m	667 °		
MOISSAT 340 m	1126 °	ST SULPICE 851 m	835 °	MARCENAT (15) 1075 m	636 °		
<b>Gain depuis 19 mai : 108°</b>		<b>Gain depuis 19 mai : 95°</b>		<b>Gain depuis 19 mai : 77°</b>		<b>Gain depuis 19 mai : 74°</b>	

### Je me repère

**650-700°** : Début des ensilages, enrubannage et foin ventilé

**900-1000°** : Foin « précoce » (début floraison des graminées)

**1200°** : Foin « tardif » (pleine floraison des graminées)

### Exploitations suivies en 2019

Bord l'étang (400 m-GN lait)	Ensilage réalisé 22/05 Foins dès que possible
Sugères (610 m- VA)	Début 3 <sup>ème</sup> tour de pâturage
Neuf Eglise (610 m- VA)	.
Chaméane (800 m- VL bio)	3 <sup>ème</sup> tour pâture Poursuite foin ventilé Apport lisier après fauche
St-Genès-Chelle (850 m-ovins bio)	Milieu 2 <sup>ème</sup> tour Enrubannages à 850m prévus fin de semaine
Pulvérières (860 m- VA)	
Egliseneuve d'Ent. (1000 m – VL)	Début 2 <sup>ème</sup> tour en plein pâturage
Laqueuille (1100 m-ovins bio)	Fin 1 <sup>er</sup> tour pâture et fin déprimage

## Conseils de la semaine : Foins en plaine et demi-montagne, début des fauches précoces et accélération de la pousse en altitude.

**Attention à la hauteur de fauche** : au dessous de 7 cm on pénalise la repousse des graminées et laisse de la place pour le développement des plantes indésirables.

**En plaine**, le stade repère des foins est atteint pour tous les types de prairies. Les secondes coupes sont à faire 5 à 6 semaines après l'ensilage. La pousse de l'herbe reste active : faire le tour des parcelles pour vérifier s'il faut agrandir la sole pâturée (en cas d'agrandissement, les regains se pâturent 3 semaines après l'ensilage).

**En demi-montagne**, la pousse de l'herbe est importante (60 kgs MS/ha/jour). Faucher les parcelles de pâture qui ont une hauteur d'herbe de plus de 12 cm et qui ne seront pas mangées dans la semaine. Le stade des foins précoces sera atteint à toutes les altitudes d'ici la fin de la semaine.

**Sur les plateaux d'altitude**, la croissance d'herbe est enfin soutenue (50 kgs MS/ha/j). Il faut faire le tour des prairies car les hauteurs d'herbe sont très variables (profondeur de sol, exposition...). Les fauches précoces (ensilage, enrubannage, foin ventilé) peuvent commencer cette fin de semaine.

**En montagne**, la pousse de l'herbe commence à être significative, notamment sur les prairies qui ont été bien mangées à l'automne. Les animaux peuvent monter sur les estives cette semaine afin de soulager les parcelles autour des sièges d'exploitation.