

Cumul des températures au 16 juin 2019 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)

Plaine (300 à 500 m)	1437°	Demi-montagne (500 à 850 m)	1224°	Plateaux d'altitude (850 à 1100m)	924°	Montagne (> 1100 m)	819°
Rappel 2018 : 1454 °		Rappel 2018 : 1246 °		Rappel 2018 : 971 °		Rappel 2018 : 876 °	
CLERMONT 330 m	1497 °	SAYAT 550 m	1363 °	CHALMAZEL (42) 990 m	919 °	ANZAT LUGUET 1270m	824 °
ISSOIRE 372 m	1415 °	AMBERT 555 m	1188 °	VERNINES 1045 m	980 °	MONT DORE 1220 m	814 °
COURPIERE 455 m	1397 °	ST GERVAIS 705 m	1178 °	ST GERMAIN L'H. 1070 m	918 °		
MOISSAT 340 m	1449 °	ST SULPICE 851 m	1104 °	MARCENAT (15) 1075 m	878 °		
Gain depuis 9 juin : 104 °		Gain depuis 9 juin : 91 °		Gain depuis 9 juin : 76 °		Gain depuis 9 juin : 69 °	

Je me repère

900-1000° : Foin « précoce » (début floraison des graminées)

1200° : Foin « tardif » (pleine floraison des graminées)

Exploitations suivies en 2019

Bord l'étang (400 m-GN lait)	Agrandissement sur repousses derrière ensilage
Sugères (610 m- VA)	Poursuite des sevrages et des foins
Neuf Eglise (610 m- VA)	3 ^{ème} tour pâture Enrubannages faits, foins en attente
Chaméane (800 m- VL bio)	Fauche de pâtures >15 cm, remplacées par des regains
St-Genès-Chelle (850 m-ovins bio)	Mise en lutte. Début du 3 ^{ème} tour pâture
Pulvérières (860 m- VA)	2 ^{ème} tour pâture Enrubannage dès que possible
Egliseneuve d'Ent. (1000 m – VL)	Fin 3 ^{ème} tour
Laqueuille (1100 m-ovins bio)	2 ^{ème} tour pâture

Conseils de la semaine : fauche à toutes les altitudes

En plaine et demi-montagne, la pousse de l'herbe mesurée se maintient entre 30 et 40 kg MS/ha/j. Les agrandissements du pâturage derrière les 1ères coupes doivent se faire 2 à 3 semaines après la fauche afin de bénéficier au maximum d'une bonne qualité d'herbe. Sur beaucoup de parcelles pâturées les refus se sont accumulés depuis le début du pâturage. L'idéal est de les faucher voire de les broyer en ne descendant pas trop bas pour ne pas compromettre la repousse (6 cm à cette époque).

Sur les plateaux d'altitude et en montagne, la pousse de l'herbe reste importante. Bien faire le tour des parcelles, afin de prévoir la fauche de parcelles initialement prévues à la pâture mais dont la qualité baisse et qui risquent d'être gaspillées (hauteurs >12 cm et non pâturées dans la semaine).

Partout, les conditions météo actuelles sont propices à bien valoriser les apports d'engrais. On peut encore apporter 30 unités d'azote derrière les 1ères coupes afin de favoriser les repousses. La fenêtre météo de cette semaine s'est un peu raccourcie. Faucher particulièrement haut (7-8cm) et botteler à 80% de MS. Le pressage doit commencer par les zones les plus exposées au soleil.

Voici quelques repères pour évaluer la teneur en MS de son foin : 65% MS certaines feuilles sont cassantes, 70-75% le foin paraît sec sauf sous les andains et > 80 % MS le fourrage est craquant. Il existe aussi des humidimètres pour contrôler l'humidité de l'andain.